

Gestión Integrada de Cítricos

Muestreo *Pezothrips kellyanus*

¿Qué variedades?

-Naranjas de los grupos Valencia y Navel y limones.

¿Cuándo?

- Desde la caída de los pétalos hasta que los frutos alcancen 3-4 cm.

-Una o dos veces por semana

¿Cómo?

-Muestrear frutos sanos y exteriores recién cuajados.

-Dos frutos por árbol.

-25 árboles por cada lado de la parcela (100 árboles)

¿Cuándo tratar?

Quando el porcentaje de frutos ocupados supere el 5% en las naranjas del grupo Navel y el 10% en las naranjas valencia y limones.

Fecha:

Parcela:

Bloque:

Variedad:

Árbol	Orientación 1		Orientación 2		Orientación 3		Orientación 4		TOTAL
	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	Fruto 1	Fruto 2	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Total									

Tratar en naranjas Navel si **TOTAL** > 10;

Tratar en naranjas Valencia y limones si **TOTAL** > 20

Gestión Integrada de Cítricos